

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಳಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ತೀವ್ರತೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶೇ.0.5-1.0 ರ ಮಣ್ಣದ ಶಿಳಿಸೆರನ್ನು ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕಗಳಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ➤ ಹುಳು ಸಾಕಣಿಕಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ರೋಗಿಗೆ ದಿತ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಪಡಿಸಿ ನಾಶಗೊಳಿಸಬೇಕು. ➤ ಹಾಸಿಗೆ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕಗಳಾದ ಸಂಜೀವಿನಿ, ವಿಜೀತ, ವಿಜೀತ ಗೀನ್, ವಿಜೀತ ಸಟ್ಲ್‌ಮೆಂಟ್, ರೇಷಂಜ್‌ಫ್ರೆಂಟ್ ಇತರೆ ಶಿಥಾರಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ➤ ಹುಳು ಸಾಕಣಿಕಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಶೈತಾಂಶ್ , ಸೋಪ್ಪಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸ್ಥಾವರಕಾಶ ಆಯಾ ಹಂತದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವೆಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದ್ದು. ➤ ಜೀವದಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ 10 ರಿಂದ 12 ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪನೇರಳೆ ಸೋಪ್ಪೆನ್ನು ರೇಷ್ಟ್ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕೆಟನಾಶಕವು ಹುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ರೋಗವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
--	---

ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ:

ಕೃಷ್ಣ ಹುಂಟಾಮಾನ ವಿಭಾಗ

ಕೃಷ್ಣ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು